

АННОТАЦИЯ

«ВЕЛТОТРИН ЛЮКС» инсектоакарицидное средство

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Содержит содержит перметрин (7 %), малатион (3 %), функциональные добавки, растворитель.

СВОЙСТВА

➤ Средство обладает широким спектром инсектицидного действия, обеспечивая гибель:

- головных и платяных вшей (имаго, личинок и яиц),
- крысиных и чесоточных клещей,
- тараканов,
- клопов,
- блох,
- муравьев,
- имаго и личинок мух и комаров.

➤ Продолжительность остаточного действия от 2-х недель до 1 месяца в зависимости от концентрации и типа обрабатываемой поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных соединений.

Сенсибилизирующие свойства не выражены.

АННОТАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

➤ Для применения на объектах различных категорий в практике медицинской дезинсекции с целью:

- уничтожения головных и лобковых вшей у взрослого населения, а также уничтожения платяных вшей на объектах различных категорий: в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), санпропускниках, распределителях, социальных приютах, учреждениях пенитенциарной системы, силовых ведомств, на санитарном транспорте и т. п. и в очагах педикулеза;
- дезинсекции помещений против вшей и чесоточных клещей на объектах различных категорий: в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), санпропускниках, распределителях, социальных приютах, учреждениях пенитенциарной системы, силовых ведомств, на санитарном транспорте и т. п. и в очагах чесотки, педикулеза;
- уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух (личинок и имаго), комаров (личинок и имаго), крысиных клещей на объектах различных категорий: в жилых, нежилых, производственных, хозяйственных, складских и подвальных помещениях, на объектах коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы, банные комплексы, бассейны, парикмахерские, общественные туалеты и т. д.); на предприятиях общественного питания (в выходные и санитарные дни); на объектах здравоохранения и социальной сферы (лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), санатории, социальные приюты, аптеки и т. п.), в детских учреждениях; в учреждениях пенитенциарной системы, силовых ведомств; на объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, депо) и т. д.;

ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО «ВЕЛТОТРИН ЛЮКС»

- уничтожения имаго мух на животноводческих фермах, в мусоросборниках, на свалках бытовых отходов и т. п., и личинок мух в содержимом выгребных ям, в твердых и жидких пищевых отбросах;
- уничтожения личинок комаров в непроточных природных и искусственных водоемах, не имеющих рыбохозяйственного значения; разливах сточных вод, подвальных помещениях.

➤ Для применения населением в быту с целью:

- уничтожения головных, лобковых вшей у взрослого населения;
- уничтожения тараканов; муравьев, клопов, блох, имаго и личинок мух и комаров, крысиных клещей.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

➤ в практике медицинской дезинсекции;

➤ для применения населением в быту.

ФОРМА ВЫПУСКА

В полимерных емкостях с завинчивающимися крышками вместимостью 0,1; 0,3; 1,0 и 5,0 л или в любой другой приемлемой для потребителя таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет, готовой эмульсии – 8 часов.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.99.19.002.E.006963.04.12

от 23.04.2012 г.

Продукция:

средство педикулицидное "ВЕЛТОТРИН ЛЮКС". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-033-71954720-2009. Изготовитель (производитель): ООО "НПО "ВЕЛТ", 119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, корп. 7 (адрес производства: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 9), Российская Федерация. Получатель: ООО "НПО "ВЕЛТ", 119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, корп. 7, Российская Федерация.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, соответствующие с которыми выдано свидетельство, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в соответствии с инструкцией по применению средства № 033-39/11-И от 26.07.2011г

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертного заключения от 12.08.2011г. № НИИ-03/11 НИИ БНТ; этикетки; рецептуры; инструкции по применению средства № 033-39/11-И от 26.07.2011г

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

№ 0208195

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

**Научно-исследовательский институт биоцидов
и нанобиотехнологий**
Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»

СОГЛАСОВАНО
Директор НИИ БНТ,
руководитель ЦН НИИ БНТ,
К. Е. Иванова
_____ 2011 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
ООО «НПО «ВЕЛТ»
М. Иванов
« 26 » _____ 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
средства инсектоакарицидного
«ВЕЛТОТРИН ЛЮКС»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

УДК 614.484 (083.131)

ББК 51.9я82

И72

Инструкция по применению средства инсектоакарицидного «ВЕЛТОТРИН ЛЮКС» (ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия). М.: ООО «Издательский Дом «ВЕЛТ», 2012 г. – 24 с.

Инструкция предназначена для работников объектов коммунально-бытового назначения (гостиниц, общежитий, банных комплексов, бассейнов, парикмахерских, общественных туалетов и т. д.); работников коммунальных служб, предприятий общественного питания; персонала учреждений здравоохранения и социальной сферы (лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), санаториев, социальных приютов, аптек и т. п.), работников детских учреждений; учреждений пенитенциарной системы, силовых ведомств; объектов транспортной инфраструктуры (вокзалов, депо и т. п.); работников учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ИНСТРУКЦИЯ № 033-39/11-И
по применению средства инсектоакарицидного
«ВЕЛТОТРИН ЛЮКС»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

Инструкция разработана:

- Некоммерческой организацией Частным Учреждением «Научно-исследовательский институт биоцидов и нанобиотехнологий» (НИИ БНТ, г. Москва);
- ООО «Научно-производственным объединением «ВЕЛТ» (ООО «НПО «ВЕЛТ», г. Москва).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инсектоакарицидное средство «ВЕЛТОТРИН ЛЮКС» представляет собой концентрат эмульсии, по внешнему виду – прозрачная жидкость светло-желтого цвета, содержит перметрин (7 %), малатион (3 %), функциональные добавки, растворитель.

1.2. Спектр действия:

1.2.1. Средство обладает широким спектром инсектицидного действия, обеспечивая гибель головных и платяных вшей (имаго, личинок и яиц), крысиных и чесоточных клещей, тараканов, клопов, блох, муравьев, имаго и личинок мух и комаров. Продолжительность остаточного действия от 2-х недель до 1 месяца в зависимости от концентрации и типа обрабатываемой поверхности.

1.3. Концентрат средства по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, а при нанесении на кожу – к 4 классу

ИНСТРУКЦИЯ № 033-39/11-И

малоопасных соединений согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. Обладает слабой кумулятивной активностью при введении в желудок. Концентрат средства при нанесении на кожные покровы и при контакте с глазами оказывает выраженное раздражающее действие.

Однократные аппликации 15 % (по препарату) водной эмульсии средства и повторные аппликации 2,0 % (по препарату) водной эмульсии средства на кожу не вызывают раздражения. Сенсибилизирующие свойства не выражены. Средство в виде 15 % (по препарату) водной эмульсии умеренно опасно по степени летучести согласно лимитирующим критериям вредности в виде паров и аэрозоля. При подостром воздействии в виде паров относится к малоопасным средствам дезинсекции согласно Классификации степени опасности средств дезинсекции.

1.4. Назначение средства:

➤ Для применения на объектах различных категорий в практике медицинской дезинсекции с целью:

- уничтожения головных и лобковых вшей у взрослого населения, а также уничтожения платяных вшей на объектах различных категорий: в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), санпропускниках, распределителях, социальных приютах, учреждениях пенитенциарной системы, силовых ведомств, на санитарном транспорте и т. п. и в очагах педикулеза.
- дезинсекции помещений против вшей и чесоточных клещей на объектах различных категорий: в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), санпропускниках, распределителях, социальных приютах, учреждениях пенитенциарной системы, силовых ведомств, на санитарном транспорте и т.п. и в очагах чесотки, педикулеза;
- уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух (личинок и имаго), комаров (личинок и имаго), крысиных клещей на объектах различных категорий: в жи-

лых, нежилых, производственных, хозяйственных, складских и подвальных помещениях, на объектах коммунально-бытового назначения (гостиницы, общежития, спорткомплексы, банные комплексы, бассейны, парикмахерские, общественные туалеты и т. д.); на предприятиях общественного питания (в выходные и санитарные дни); на объектах здравоохранения и социальной сферы (лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), санатории, социальные приюты, аптеки и т. п.), в детских учреждениях; в учреждениях пенитенциарной системы, силовых ведомств; на объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, депо) и т. д.;

- уничтожения имаго мух на животноводческих фермах, в мусоросборниках, на свалках бытовых отходов и т. п., и личинок мух в содержимом выгребных ям, в твердых и жидких пищевых отбросах;
- уничтожения личинок комаров в непроточных природных и искусственных водоемах, не имеющих рыбохозяйственного значения; разливах сточных вод, подвальных помещениях.

➤ Для применения населением в быту с целью:

- уничтожения головных, лобковых вшей у взрослого населения;
- уничтожения тараканов; муравьев, клопов, блох, имаго и личинок мух и комаров, крысиных клещей.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЭМУЛЬСИЙ

2.1. Средство применяется в виде водных эмульсий. Рабочие водные эмульсии имеют молочный цвет.

2.2. Рабочие водные эмульсии готовят непосредственно перед применением. Для этого средство смешивают с водопроводной или отфильтрованной водой ближайших водо-

ИНСТРУКЦИЯ № 033-39/11-И

емов, постоянно и равномерно размешивая в течение 5 минут. Готовую эмульсию следует использовать в течение 8 часов.

2.3. Для нанесения средства используют любую распыливающую аппаратуру, предназначенную для распыления растворов и эмульсий инсектицидов по поверхностям (автоматксы, мелкокапельные ранцевые опрыскиватели, крупнокапельные многолитражные опрыскиватели, мало- и микролитражные опрыскиватели). Основное условие – обеспечение равномерного покрытия рабочей эмульсией всей поверхности. При обработке помещений, водоемов пользуются распыливающей крупнокапельной аппаратурой с весовым медианным диаметром капель 100–350 мкм. В таблице 1 приведен расчет количества средства, необходимого для приготовления рабочих эмульсий.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства

Вид членистоногого	Концентрация рабочей эмульсии		Количество средства в рабочей эмульсии, мл			
			1 л		10 л	
	по ДВ, %	по сред- ству, %	Сред- ство, мл	Вода, мл	Сред- ство, мл	Вода, мл
1	2	3	4	5	6	7
Тараканы	0,5	5,0	50	950	50	9500
	1,0	10,0	100	900	1000	9000
Мухи имаго	0,5	5,0	50	950	500	9500
	1,0	10,0	100	900	1000	9000
Мухи личинки	1,0	10,0	100	900	1000	9000
Клопы, имаго	0,5	5,0	50	950	500	9500
Клопы, яйца	1,5	15,0	150	850	1500	8500
Блохи	0,5	5,0	50	950	500	9500

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

Продолжение табл. 1

1		2	3	4	5	6	7
Кома- ры	имаго	0,125	1,25	12,5	987,5	987,5	9875
		0,25	2,5	25	975	975	9750
	личин- ки	0,015	0,15	1,5	998,5	998,5	9985
		0,030	0,30	3,0	997	997	9970
Муравьи		0,25	2,5	25	975	250	9750
Клещи крысиные		0,5	5,0	50	950	500	9500
Вши головные, лобковые		0,2	2,0	20	980	200	9800
Вши платяные (замачивание одежды)		0,2	2,0	20	980	200	9800
Вши платяные Чесоточные клещи (обработка помещений)		0,5	5,0	50	950	500	9500

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

3.1. Уничтожение головных и лобковых вшей.

Уничтожение головных и лобковых вшей проводят 2 % (по препарату) водной эмульсией. Эмульсию нанести тампоном на увлажненные волосы головы или других частей тела (при лобковом педикулезе), слегка втирают в кожу. Норма расхода эмульсии при головном и лобковом педикулезе составляет 30–100 мл на человека в зависимости от степени зараженности насекомыми, длины и густоты волос. Через 30 минут с обработанных частей тела средство смыть проточной теплой водой и вымыть обработанные места обычным способом, волосы ополоснуть 5 % водным раствором уксусной кислоты и вычесать частым гребнем для удаления погибших насекомых и яиц.

Через 7–10 дней обработку повторить!

3.2. Уничтожение платяных вшей

3.2.1. Уничтожения платяных вшей проводят 2 % (по препарату) водной эмульсией препарата, используя два метода:

- замачивание завшивленных вещей;
- орошение их из распыливающей аппаратуры.

3.2.2. Нательное, постельное белье и другие изделия, подлежащие обработке, замачивают в водной эмульсии в течение 60–120 мин. Норма расхода на комплект нательного белья составляет 2,5 л; на комплект постельного белья или 1 кг сухих вещей – 4,5 л. После дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на сутки в растворе кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды), после чего стирают обычным способом.

3.2.3. Верхнюю одежду, постельные принадлежности и прочие вещи орошают водной эмульсией до легкого увлажнения. С особой тщательностью обрабатывают места обитания насекомых: воротники, пояса, швы, складки. Норма расхода на платье из шерсти составляет 30–50 мл; на комплект постельных принадлежностей (матрац, одеяло) – 400 мл; на комплект одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка) – 350 мл. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе (в течение дня).

3.3. Дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей.

3.3.1. Обработку водной эмульсией в концентрации 5,0 % по препарату проводят в очагах педикулеза и чесотки (включая бытовые); в помещениях, в которых осматривают больных чесоткой и педикулезом (скабиозории, приемные

отделения ЛПУ, изоляторы, санпропускники и т. п.), а также в транспортных средствах, которые использовались для перевозки этих больных. Обработке подлежат пол, стулья, кушетки, дверные ручки и другие предметы, с которыми больной или его вещи имели контакт.

3.3.2. Пол орошают из аппаратов типа «Квазар», «Жук», «ОП-10», «Росинка» и др. Другие поверхности протирают ветошью, смоченной водной эмульсией. Норма расхода эмульсии составляет 50–100 мл на 1 м² в зависимости от типа поверхности (невпитывающая и впитывающая).

3.3.3. Обработку проводят ежедневно по окончании приема пациентов в отсутствии людей. Средство убирают влажным способом с добавлением кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды) с поверхностей, с которыми непосредственно могут контактировать люди (поверхности стульев, кушеток, столов и т.п.) не ранее, чем через 1 час после обработки. Уборку можно произвести на следующий день до начала приема пациентов.

3.4. Уничтожение тараканов.

3.4.1. Для уничтожения синантропных тараканов средство используют в виде 5 % (по препарату) водной эмульсии с нормой расхода 50 мл/м² на невпитывающих поверхностях или 10 % (по препарату) водной эмульсии с нормой расхода 100 мл/м² на впитывающих поверхностях методом орошения и/или протирания.

3.4.2. Эмульсией обрабатывают места обитания тараканов и пути их проникновения в помещение: пороги, щели вдаль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, вдоль труб водопроводной, канализационной систем, щели в стенах, за дверными коробками, и т. п.; за предметами об-

ИНСТРУКЦИЯ № 033-39/11-И

становки (буфеты, полки, стеллажи обрабатывают с задней стороны).

3.4.3. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы. При большой заселенности насекомыми обрабатываются смежные помещения в целях ограждения их от заселения тараканами. Погибших и парализованных насекомых систематически сметают и уничтожают.

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

3.5. Уничтожение постельных клопов.

Для уничтожения постельных клопов средство используют в виде 5 % (по препарату) водной эмульсии на невпитывающих жидкость поверхностях; 10 % (по препарату) водной эмульсии – на впитывающих. Средство наносят на места обитания и концентрации насекомых. Обработывают щели в стенах и мебели, кровати, места отслоения обоев в других декоративных, шумопоглощающих и т. п. покрытий, за плинтусами и радиаторами системы отопления из расчета 100 мл/м².

Постельные принадлежности не обрабатывать!

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

3.6. Уничтожение блох.

Для уничтожения блох в помещениях средство используют в виде 2,5 % (по препарату) водной эмульсии на невпитывающей жидкость поверхности и 5 % (по препарату) водной эмульсии – на впитывающих. Обработывают поверхность пола, щели за плинтусами, стены на высоту до 1 м. Норма расхода средства составляет 50 мл/м² на невпитывающей поверхности и 100 мл/м² – на впитывающей.

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям.

3.7. Уничтожение муравьев.

Для борьбы с рабочими особями рыжих домовых и других видов муравьев, которые часто проникают в помещения, обрабатывают поверхности по путям передвижения насекомых, в местах их скопления. Норма расхода препарата – 50 мл 2,5 % по препарату водной эмульсии на 1 м², независимо от типа обрабатываемой поверхности.

Повторные обработки проводятся по энтомологическим показаниям.

3.8. Уничтожение крысиных клещей.

3.8.1. Орошают лазы, трубы различных коммуникаций, плинтусы, стены и полы вдоль них, а также места возможного скопления клещей: обогреваемые участки стен и полов около отопительных приборов и тепловых коммуникаций, нижнюю часть мебели, рабочие столы, которые обрабатывают целиком, включая имеющиеся в них ящики. При наличии фальшпокрытий, за которыми могут перемещаться грызуны, потолки и стены также подлежат обработке.

3.8.2. Для предотвращения развития крысиных клещей в отходах ЛПУ (твердые и пищевые отходы) перед проведением дератизации обрабатывают 5 % (по препарату) рабочей водной эмульсией в норме расхода 50–100 мл/м² поверхности отходов, мусоросборников, межкорпусных контейнеров, площадок вокруг контейнеров.

Повторную обработку проводят при появлении клещей.

3.9. Уничтожение мух.

3.9.1. Для уничтожения имаго комнатных или других видов мух в помещениях используют 10 % (по препарату) рабочую водную эмульсию, которой орошают места их по-

ИНСТРУКЦИЯ № 033-39/11-И

садки (стекла и рамы окон, дверные коробки и пр.). Норма расхода – 100 мл/м².

Повторные обработки проводят при появлении окрыленных мух в помещении.

3.9.2. Для уничтожения имаго мух на открытом воздухе используют 10 % (по препарату) водную эмульсию. Норма расхода – 100 мл/м². Обработке подлежат бункеры, контейнеры, площадки и ограждения мусоросборников, свалки, стены хозяйственных построек, скотных сараев подсобных хозяйств, туалетов наружного типа и т. п.

3.9.3. Для уничтожения личинок комнатных мух в жидких отбросах используют 10 % (по препарату) водную эмульсию при слое жидких отбросов толщиной до 0,5 м. Норма расхода средства 1 л/м². Для обработки скоплений твердых отбросов с толщиной слоя до 0,5 м рекомендуется использование 15 % (по препарату) водной эмульсии при норме расхода 1 л/м², а при толщине твердых отбросов выше 0,5 м – 2 л/м². При значительной толщине слоя твердых отбросов рекомендуется увеличивать расход 15 % (по препарату) водной эмульсии по 2 л на каждые 0,5 м увеличения толщины слоя. Обработке подлежат: содержимое выгребных ям, бытовые отходы и пищевые отбросы.

3.9.4. Обработки проводят в теплое время года с периодичностью 10–20 дней. Первая обработка проводится через 10–14 дней с момента установления положительных значений ночной температуры воздуха при показателе среднесуточной температуры более 10 °С. Периодичность повторных обработок может быть сокращена до 7–10 дней при показателе среднесуточной температуры 25–30 °С.

3.10. Уничтожение комаров.

3.10.1. Для уничтожения окрыленных комаров в помещениях используют водную эмульсию средства 2,5 % (по препарату) на не впитывающих жидкость поверхностях и 5 % (по препарату) – на впитывающих поверхностях. Средством орошают выборочно места посадки комаров в хорошо проветриваемых помещениях, а также наружные стены строений.

Норма расхода составляет 50 мл/м² на невпитывающих поверхностях и 100 мл/м² – на впитывающих поверхностях. Повторные обработки проводят при появлении окрыленных комаров.

3.10.2. Для уничтожения личинок комаров в местах выплода используют 0,15 % (по препарату) водную эмульсию средства в норме расхода 150 мл/м² при глубине водоема не более 0,5 м. При сильном загрязнении воды органическими веществами можно использовать 0,3 % (по препарату) водную эмульсию средства.

Средство можно использовать только для обработки закрытых водоемов (затопленные подвалы домов, емкости для сбора сточных вод, скопления воды в подземных коммуникациях), полей фильтрации, закрытых емкостей для противопожарных целей и т. д. Не применять в водоемах хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного назначения!

Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям при появлении в водоемах личинок комаров 2–3 возраста.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Общие требования.

К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж по правилам работы, хранению, мерам профилактики и оказания первой помощи.

4.2. Меры предосторожности при уничтожении вшей.

4.2.1. Во избежание попадания средства в глаза, нос и рот – перед обработкой волос пациенту следует повязать вокруг головы (ниже волос) хлопчатобумажную косынку, свернутую жгутом. Для предохранения слизистых оболочек половых органов и анального отверстия использовать ватные и марлевые тампоны.

4.2.2. Не обрабатывать детей, беременных и кормящих женщин, людей с повышенной чувствительностью к препарату, а также лиц страдающих кожными заболеваниями.

4.2.3. Обработку пациентов, белья (одежды), помещений проводить при открытых форточках (окнах).

4.2.4. Зараженные вшами вещи замачивают в плотно закрытых емкостях.

4.3. При обработке помещений от синантропных насекомых.

4.3.1. На время проведения обработки убрать (или тщательно укрыть) продукты и столовую посуду, удалить из помещения животных, птиц, закрыть аквариумы. Лекарственные препараты и инструменты должны быть убраны в шкаф.

4.3.2. Лица, проводящие дезинсекцию, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты (халат или комбинезон, косынка, клеенчатый или прорезиненный фартук и нарукавники, перчатки резиновые технические или рукавицы хлопчатобумажные с пленочным покрытием).

При использовании средства способом орошения для обработки вещей и помещений использовать защитные очки (ПО-2, ПО-3, моноблок) и респираторы универсальные с противогазовым патроном марки А (РУ-60, М, РПГ-67 и др.).

4.3.3. При работе со средством соблюдать правила личной гигиены. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы вымыть руки, лицо с мылом и прополоскать рот.

4.3.4. Дезинсекцию выполняют при открытых форточках, окнах или дверях. По окончании работы помещение следует проветрить в течение не менее 30 мин.

4.3.5. После окончания работ спецодежду снимают и проветривают. Стирают по мере загрязнения, не реже 1 раза в неделю в горячем содовом растворе (50 г кальцинированной соды на ведро воды).

4.3.6. Хранят индивидуальные средства защиты в шкафчиках в специальных помещениях. Хранить их на складе вместе с ядохимикатами, а также в других помещениях дезинфекционных учреждений категорически запрещается.

4.3.7. Дезинсекцию на предприятиях пищевой промышленности, в магазинах, столовых, детских учреждениях и т. п. проводят в санитарные дни. Обработку пищевых производств выполняют при остановке автоматических линий на профилактический осмотр.

4.3.8. В жилых, служебных помещениях, гостиницах, общежитиях дезинсекцию проводят в утренние часы. При использовании средства в лечебных учреждениях дезинсекцию выполняют в отсутствие больных.

4.3.9. Хранят средство отдельно от пищевых продуктов, в местах недоступных детям!

4.3.10. Обработанными помещениями нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят не ранее, чем через 24 часа после дезинсекции и не позднее, чем за 2 часа до использования объекта по назначению. Уборку проводят в перчатках, влажным способом с добавлением кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды) или мыльным раствором хозяйственного мыла. При уборке руки защищают резиновыми перчатками.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При нарушении правил безопасности или при несчастных случаях может развиваться острое отравление, признаками которого является неприятный вкус во рту, слюнотечение, рвота, головная боль, тошнота, боли в брюшной области, сужение зрачков, раздражение органов дыхания.

5.2. При случайном попадании в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, затем промыть желудок 2 % раствором пищевой соды или выпить 1–2 стакана воды с добавлением адсорбента (10–12 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). Ни в коем случае не вызывать рвоту и не вводить ничего в рот человеку, потерявшему сознание.

5.3. При несоблюдении мер предосторожности возможно ингаляционное отравление. Пострадавшего вывести на све-

**УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ,
МЕРЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

жий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рот и нос 2 % раствором пищевой соды.

5.4. При случайном попадании средства в глаза обильно промыть их водой и закапать 1–2 капли средства с противовоспалительным действием, при болезненности – 2 % раствор новокаина.

5.5. При загрязнении кожи снять капли эмульсии ватным тампоном или тканевой салфеткой и др., не втирая, затем вымыть загрязненный участок мылом.

5.6. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу.

Антидот – атропина сульфат и препараты красавки.

**6. УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВА
В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ,
МЕРЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

6.1. В случае аварийной ситуации необходимо надеть защитную одежду (комбинезон, защитные очки, резиновые перчатки и обувь, респиратор).

6.2. Разлитое средство засыпать впитывающим материалом (песком, опилками, ветошью или др.) и залить 3–5 % раствором кальцинированной соды или 7 % раствором негашеной хлорной извести, а затем собрать в специальную емкость и отправить на утилизацию на полигоны промышленных токсических отходов или места согласованные с местными природоохранными органами или учреждениями Роспотребнадзора. В соответствии с СанПиН 1.2.1077-01 загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести, после чего вымыть мыльно-содовым раствором.

Работы проводить в защитной одежде, резиновых перчатках, сапогах, резиновых фартуках, защитных очках, респираторе РУ-60-М.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

7.1. Средство транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующих на данном виде транспорта.

Маркировка транспортной тары должна содержать предупредительную надпись «Огнеопасно!», манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от солнечных лучей», «Ограничение температуры» с указанием интервала температур от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Знак опасности в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 19433 – класс 3, подкласс 3.2, классификационный шифр 3213, чертеж 3, номер ООН 1219.

7.2 Средство хранят в сухих складских помещениях, в защищенном от света и прямых солнечных лучей месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

7.3. Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке изготовителя.

7.4. Средство выпускается в полимерных емкостях с завинчивающимися крышками вместимостью 0,1; 0,3; 1,0 и 5,0 л., обеспечивающими сохранность продукции в течение гарантийного срока годности, или в любой другой приемлемой для потребителя таре в соответствии с действующей нормативной документацией.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.