

ИНСТРУКЦИЯ № 1/06 от 14.04.2006 г.
по применению средства дезинфицирующего (кожного антисептика)
"ДезисептИ" производства ООО "Дезиндустрия", Россия

Разработана: ФГУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора,
ООО "Дезиндустрия", Россия

Авторы:

от ФГУН НИИ Дезинфектологии - Пантелеева Л.Г., Анисимова Л.И., Мельникова Г.Н.,
Родионова Р.П., Сукиасян А.Н.

от ООО "Дезиндустрия" - Зубова Е.Н., Храповский И.Г., Пирогов А.В., Сташ Е.Н.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "ДезисептИ" представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бледно-желтого до зеленовато-желтого цвета с запахом, характерным для изопропилового спирта. Содержит в качестве действующих веществ изопропиловый спирт – 70 % и алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,13 %; кроме того, в состав средства входят функциональные добавки.

Срок годности средства - 2 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Средство "ДезисептИ" обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза) дрожжеподобных грибов рода Кандида.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности, при нанесении на кожу введении в желудок, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсibilизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены.

ПДК изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м³, 3 класс опасности.

1.4. Средство предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях и родильных домах; для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.); работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, объектов коммунальных служб.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК:** 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек. Для профилактики туберкулеза на кисти рук наносят трижды по 3 мл средства, общее время обработки не менее 2 мин.

2.2. **ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ:** перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут не менее, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят средство дважды по 5 мл и втирают его в кожу рук и предплечий. Общее время обработки средством 5 мин.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать только для наружного применения.

3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.3. Избегать попадания средства в глаза!

3.4. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.

3.5. По истечении срока годности использование средства запрещается.

3.6. Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию и, в сточные/поверхностные и подземные воды.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном отравлении через рот обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться за врачебной помощью.

4.2. При случайном попадании средства в глаза тщательно промыть их водой. При появлении гиперемии закапать 30 % раствор сульфацила натрия.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Средство выпускается в полимерных флаконах вместимостью 0,1 дм³, 0,2 дм³, 0,5 дм³, 1 дм³; полимерных канистрах вместимостью 3 дм³, и 5 дм³.

5.2. Транспортировку средства производят любым видом наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки горючих, воспламеняющихся жидкостей, содержащих изопропиловый спирт, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.3. При случайной утечке большого количества средства засыпать его песком или землей (не использовать горючие материалы, например опилки, стружку), собрать в емкости для последующей утилизации. Утилизация – сжигание. При уборке больших количеств средства следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «А» или промышленный противогаз.

5.4. Средство хранить в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от плюс 5⁰С до плюс 30⁰С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня (расстояние не менее 1 метра), прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 2 года.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

По показателям качества средство «ДезисептИ» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

NN п/п	Наименование показателей	Норма
1.	Внешний вид	прозрачная жидкость от бледно-желтого до зеленовато-желтого цвета
2.	Запах	характерный для изопропилового спирта
3.	Массовая доля спирта изопропилового, %	70 ± 3
4.	Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида, %	0,13 ± 0,02